



# Drogy



Perník jediňe na Vánoce...



## Nejčastěji zneužívané drogy v ČR a jejich účinky

	Název	Vzhled-forma	Závislost		Potřeba zvyčování dávek	Doba účinku v hodinách	Způsob použití	Možné účinky	Projevy předávkování	Abstinenční příznaky
			psych.	fyz.						
Canabis	MARIHUANA <small>tráva, joint, marijánka</small>	sušené listy, květové palice	nízká	žádná	spíš ne	2 - 4	kouřením, ústně	euforie, uvolnění zábran, zvýraznění chuti k jídlu, zmatené chování, zesílení momentálního duševního stavu, "flashback"	únava, paranoia, možná psychóza, krátkodobé selhání paměti, nevolnost	může být i nepříliš výrazná nespavost, zvýšená aktivita, občas ztráta chuti k jídlu, nervozita
	HAŠIŠ <small>chaš, charas, čokoláda, gram</small>	světlé až tmavě hnědá plast. hmota	nízká	žádná	spíš ne	2 - 4				
	HAŠIŠOVÝ OLEJ	olej	nízká	žádná	spíš ne	2 - 4				
Stimulační	PERVITIN <small>perník, pufka, poří, piko, lce</small>	hnědý až bílý prášek, roztok	vyšoká	možná	ano	2 - 8	ústně, šňupáním, injekčně	pokles soustředění, excitace, euforie, pokles tepové frekvence a krevního tlaku, ztráta chuti k jídlu, celková stimulace, pocit zvýšené fyzické a psychické výkonnosti, schopnost volit se do druhého, nespavost	pokles tělesné teploty, křeče, halucinační-paranooidní psychóza	apatie, dlouhý spánek, podrážděnost, deprese, nervozita, neklid
	KOKAIN <small>Fermetrák, metrák</small>	bílý prášek, různobarevné tablety	vyšoká	možná	ano	1 - 2	šňupáním, kouřením, injekčně			
	CRACK	bílé krystalky-bílá hmota	vyšoká	možná	ano	1 - 2	kouřením			
	MDMA, MDA... <small>extáze</small>	barevné tablety s ražbou	možná	možná	ano	2 - 4	ústně			
	FENMETRAZIN	prášky	vyšoká	možná	ano	2 - 4	ústně			
Opiáty	HEROIN <small>herák, White lady, háčko, hero</small>	prášek od bílé po hnědou	vyšoká	vyšoká	ano	3 - 6	injekčně, šňupáním, kouřením, inhalací	euforie, zklidnění, nevolnost, útlum dýchání, zúžené zornice, tělesný útlum, znecitlivění, pocit hostejnosti vůči problémům	pomalé, povrchní dýchání, lepkavá kůže, křeče, kóma, zástava dechu a krevního oběhu	vodnaté oči, zivání, ztráta chuti k jídlu, podrážděnost, třes, panika, nevolnost, zimnice, pocení, bolesti svalů a kloubů, průjem
	MORFIN <small>White shit, emko</small>	ampule	vyšoká	vyšoká	ano	3 - 6	injekčně, kouřením			
	CODEIN <small>káčko</small>	tableta, roztok	střední	střední	ano	3 - 6	ústně, injekčně			
	BRAUN <small>běčko, braun</small>	hnědá tekutina	vyšoká	vyšoká	ano	3 - 6	injekčně			
	OPIUM <small>substituční droga</small>	hnědá hmota	vyšoká	vyšoká	ano	3 - 6	ústně, kouřením			
	METADON	prášek, roztok	vyšoká	vyšoká	ano	12 - 24	ústně, injekčně			
Halucinogeny	LSD <small>trip (v malé dávce), acid</small>	prášek, různobarevné tablety, impregnované čtverečky papíru, tinktura	střední	žádná	ne	2 - 8	ústně	přeludy, halucinace, změněné vnímání času a prostoru, "flashback"	psychózy, sebevraždy	působení nevypočítatelné
	PSYLOCIBIN <small>Lysohlévka, houbičky</small>	sušené hlavičky, vývar, výluh	střední	žádná	ne	2 - 4	ústně			
	MESKALIN <small>knoflíky</small>	sušené hlavičky, vývar, nálev, prášek	střední	žádná	ne	2 - 6	ústně			
Tělnavé látky	TOLUEN	čirá tekutina s výrazným zápachem	střední až vysoká	možná	ano	2 - 4	inhalací, ve spreji	otupění, polospánek, psychologický útlum, poruchy vnímání	poškození jater, dýchacích cest, mozkových tkání	Předrážděnost, deprese, nespavost
	ACETON				ano	1 - 2				
	NITROŘEDIDLO				ano	1 - 2				
Tlumicí látky	DIAZEPAM	tablety, ampule	střední až vysoká	střední	ano	4 - 8	ústně, často s alkoholem	celkový útlum, setřená, dezorientace	povrchní dýchání, lepkavá kůže, rozšířené zornice, slabý a rychlý puls, kóma	úzkost, nespavost, třes, delirium, křeče, epileptické záchvaty
	ROHYPNOL			střední	ano	Individuální				
	RADEPUR			střední	ano	1 - 8				
	FENOBARBITAL			střední až vysoká	ano	1 - 8				
	SEKONAL			střední až vysoká	ano	1 - 8				
	MEPROBAMAT			střední až vysoká	ano	1 - 8				

Zdroj: Sběratel pro protidrogovou prevenci u dětí a mládeže, Praha



Marihuana



Crack



Morfin



Opium



Metadon



LSD